

INTRAUTERINE DEVICE (IUD) PATIENT CONSENT FORM / El Dispositivo Intrauterino (DIU) Forma de Consentimiento para el Paciente.

Cómo Funciona: Un DIU es un pequeño lazo de alambre formado como una "T". Su proveedor de la asistencia médica lo coloca en su útero durante una visita. Dos clases de DIUs están disponibles en los Estados Unidos. El Paraguard, que previene embarazo durante 10 años y el Mirena, que previene embarazo durante 5 años. Ellos son igualmente efectivos y pueden ser quitados en cualquier momento. Los investigadores creen que el Paraguard previene embarazo previniendo que la esperma nade hasta encontrar el huevo. El Mirena, contiene el "levonorgestrel" de hormona, (esto es semejante a la "progesterona" hormona que produce su cuerpo), así que se cree prevenir la esperma de alcanzar el huevo y también afinar el útero que forra y espesa el moco cervical. El Paraguard es una elección buena si usted quiere evitar hormonas. Ambos DIUs tienen una cuerda delgada conectada en la base de la "T". Esto permite a su proveedor de asistencia médica quite el DIU en la oficina /o para asegurarse que el DIU está en el útero.

Usted nunca debe tratar de quitar su propio DIU ni tener a un amigo o pareja que intente hacerlo.

Beneficios: DIUs son tan efectivos como ligitación tubárica (tubos atados)- pero a diferencia de un "tubárico", un DIU es completamente reversible. Anualmente, menos que un usuario de DIU en cien se queda embarazada. DIUs son también fáciles de utilizar como tubárico, porque una vez que el DIU es colocado, no hay nada que usted tenga que hacer para hacerlo trabajar. Un DIU es también tan privado como un tubárico. Una vez insertido, usted y su pareja no deben sentirlo. Si usted tiene dolor o él siente algo en su vagina, puede significar que el DIU se está cayendo. Usted puede llamar a su proveedor de asistencia médica en seguida.

Una vez que un DIU es quitado, o comienza a caerse puede quedar embarazada inmediatamente.

Riesgos Serios: DIU es muy seguro, pero al igual que con toda clase del control de la natalidad, hay efectos secundarios. El riesgo más común es una infección llamada Enfermedad Incurable Pélvica (PID). PID se desarrolla cuando las bacterias que están normalmente en la vagina o enfermedades de transmisión sexual (STD) viajan hacia el útero. Es el STD o las bacterias, no el DIU que causa PID. Así que, usuarios de DIU deben ser muy cuidadosos de no conseguir STD. Por eso su proveedor de asistencia médica lo examinará antes de insertir su DIU. No tenga un DIU insertido si usted no ha sido probada del STD recientemente. Recuerde, DIUs no protegen contra STD ni VIH- sólo condones. Incluso si usted no tiene relaciones sexuales regularmente, consiga un examen de STD un par de veces al año, o cada vez que usted adquiera una nueva pareja, y siempre que usted piense que quizás tenga algo incluso si usted no sufre de las siguientes síntomas como dolor abdominal, descarga, comezón, o mal olor. Si usted tiene más de una pareja o su pareja tiene más de una pareja, el DIU no es el método anticonceptivo más seguro para usted. Un segundo riesgo grave es embarazo. Cualquier control de la natalidad puede fallar. A veces puede ser la caída de DIU o a veces no trabajan. Quedándose

embarazada con un DIU en el útero es peligroso, el embarazo será ectópico (en sus tubos) y usted abortará. Si usted pierde su período, o tiene síntomas de embarazo, dolor pélvico, o sangra, usted debe llamar a su proveedor de asistencia médica inmediatamente. Un tercer riesgo grave es que el DIU se puede mover más alto en el útero o aún fuera del útero en la pelvis. Si esto sucede la cuerda sera más corta de lo usual o usted pueda que no lo sienta. En ese caso usted debe llamar a su proveedor de asistencia médica inmediatamente.

Usted podría quedarse embarazada y el DIU quizás tenga que ser quitado quirúrgicamente.

Otros posibles efectos secundarios: Usted puede tener los períodos más pesados o más largos y/o manchar entre sus períodos. Esto debe irse dentro de unos pocos meses. Usted también puede desarrollar anemia (volumen baja de sangre), dolor de espalda, dolor durante sexo, mas obstaculizar menstrual, o una reacción alérgica.

Yo he leído esta información y lo revise con mi proveedor de asistencia médica. Mis preguntas y las preocupaciones han sido contestadas. Sé que puedo contactar el dispensario en algún tiempo dado con preguntas y debo hacer así si tengo problemas como: obstaculizando, dolor abdominal más de unas pocas horas, sangrado vaginal que dura más largo que un período normal o marca entre períodos o después de sexo, pierdo un período, descarga vaginal excepcional, fiebre o fríos inexplicados, expuestos a un STD, no sienta el cordón o piense que la cuerda esta mas larga o más corta, o cuando mi pareja o yo comience a tener dolor durante sexo o sentirse algo duro en la vagina.

Nombre del Paciente

Firma

Testigo

Fecha